[患部]犬外皮 [バイタル] 10(10)

[手術時間] 5:00:00



一 クルルマ・メタル 一

The patient's Life is in your hands	
カウンターショックで心拍を復活させる	20
カランダーショックで心相を接着させる	
2 1回目の心細動が発生するまで3~3の手順を	
進める(心細動→P31)	
2500 ( 15 (14) 15 (17)	
る 右側に発生している血溜まり×3を吸引	0
( 散弾摘出→P28 )	
刺さっている弾×3を回収して 弾痕の血溜まり×	12
3を吸引(散弾摘出→P28)	
5 追加トレイの人工膜を弾痕×3に乗せて人工膜を	10
まとめて定着させる(弾痕処置→P28)	
1	
⑤ 左側にある血溜まりの左右に発生する出血×2を	•
治療(出血→P24)	
7 心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ	
ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31)	
フヨノノ でもって 後方でとる(で加重の 101)	
⑧ 次の心細動が発生するまでに 3~3の手順を進	
める(心細動→P31)	
中央にある血溜まり×2のみを吸引	2
(散弾摘出→P28)	
11 ガイドラインに沿って弾痕×2を切開し、血溜まり	12
×2を吸引(散弾摘出→P28)	
カル・ブルス弾くのも同地し 弾痕のかっかいと	0.4
<ul><li>刺さっている弾×2を回収し、弾痕の血溜まり×2</li><li>を吸引(散弾摘出→P28)</li></ul>	21
で9051(似準備山→ピ20)	
2 追加トレイの人工膜を弾痕×2に乗せて人工膜を	10
まとめて定着させる(弾痕処置→P28)	
13 血溜まりと血溜まりの間に発生する出血を治療	
(出血→P24)	
14 心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ	ZO
ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31)	

残った血溜まり×2を①~②の手順で処置 (散弾摘出→P28、弾痕処置→P28) 右側に発生する出血を治療(出血→P24) 心細動が発生。心停止になった場合はカウンタ ZB ーショックで心拍を復活させる(心細動→P31) 19 次の心細動が発生するまでに20~20手順を進 める(心細動→P31) 20 バイタルを40ぐらいまで回復する (バイタル回復→P23) 内出血×4の場所を特定し、患部をまとめて切開 (内出血→P29) 内出血の血溜まり×4を吸引し、吸引した順番で 切開口×4を縫合(内出血→P29) カウンターショックで心拍を復活させる Z B (心細動→P31) The patient is saved



開始直後の最大バイタル値 は10だが、カウンターショック 後に心拍が安定すれば最大 で75まで復活させられる。



心拍を復活させると手術終 了 バイタルの回復はできな いので、VITALS BOUNSの 得点は稼げない。

# SPECIAL BONUS

5 次の心細動が発生するまでに00~00の手順を進

Easy	Normal	Hard	倍率
		1	1.3
120	180	200	1.2
40	50	60	1.2
12	9	8	1.3
	120 40	120 180 40 50	120 180 200 40 50 60

### OPERATION BANK

ランク		Easy	Normal	Hard
	C	0 ~ 2699	0~3399	0~4799
	В	2700 ~ 2799	3400 ~ 3799	4800 ~ 5099
	A	2800 ~ 2999	3800 ~ 4099	5100 ~ 5399
	S	3000 ~	4100 ~	5400 ~ 5599
2004	XS			5600 ~





[患部]火傷外膚

[パイタル] 10(10)

[手術時間] 10:00:00

カウンターショックでバイタル

の上限が65まで増える。安 全に進めるなら次の手順に

進むまえに回復しておこう。

## ○ 患者のバイタル値と連続執刀クリア目標タイム

- ◇1人目/火傷皮膚/10(10)/残り7:54:00(2分6秒で処置)
- ◇2人目/小腸/45(65)/残り6:43:00(1分11秒で処置)
- ◇3人目/左肺/55(80)/残り5:10:00(1分33秒で処置)
- ◇4人目/脾臓、肋骨/30(65)/残り3:51:00(1分19秒で処置)
- ◇5人目/心臓/50(65)/残り3:14:00(1分37秒で処置)

し、移植用皮膚を切り取る(移植皮膚→P32)

重度の火傷(黒く変色した火傷)は移植皮膚を 乗せるまえに除去する(重度の火傷→P32)

火傷の血溜まりを吸引し、移植皮膚を火傷部分

がイタルが低下したら回復(バイタル回復→P23)

6 2~6を繰り返し、胸部にある火傷を処置(移植 皮膚→P32、火傷→P32、重度の火傷→P32) 術野を下に移動させ 腹部にある火傷を2~5

の手順で処置(移植皮膚→P32、火傷→P32、

右図(血溜まり発生位置)の血溜まり(()、(3)、(6)、(6)

追加トレイの人工膜を弾痕に乗せて定着させる

□ 3、3の手順で右図(血溜まり発生位置1)の血 溜まりの、③、⑤の血溜まりを処置 (弾痕処置→P28)

1 右図(血溜まり発生位置1)の血溜まり⑥、〇を

吸引し、弾痕を切開する(散弾除去→P28)

2 切開した弾痕の血溜まりを吸引し、弾を回収

3 3、3の手順で弾痕の血溜まりを処置 (弾痕処置→P28)

4 腹部を消毒して切開(切開→P24)

重度の火傷→P32)

(弾痕処置→P28)

(散弾除去→P28)

を吸引(弾痕処置→P28)

2人目の患者

に4枚乗せて定着させる(火傷→P32)

The p

57tH7 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	まずは培養液の投与か 血溜まりの処置からお Slo	BULIT.
he patient's Life is in your hands			72100000000
		VITALS O	Time Limit
1人目の患者		11000	
カウンターショックで心拍を復活させ、バイタルを	28	01 01	
回復(バイタル回復→P23)			
		LOS MANAGEMENT	100
位義法(芸色の法体)を出去の士 ト半阜に投与	11	移植用皮膚は、あらか	Co.

移植用皮膚は、8枚分をまと めて作るといい。配置場所 を間違えやすければ左下も切 って9枚作ろう。



初期段階から黒く変色してい る皮膚がいくつかあるが、火 傷を一定時間放置した場合 も黒く変色した皮膚になる。



黒く変色した皮膚の上に血 溜まりが発生した場合、先に 血溜まりを吸引しないと切り 離せないので注意したい。



血溜まりを吸引しても、すぐに また血溜まりが再発すること もある。移植皮膚は素早く4 枚乗せて定着させたい。

### ■ 血溜まり発生位置 1

001



左図の記号は、チャート表の番号 と対応しており、〇~〇の血溜ま りの下には弾痕が、⑥と⑪の下 には散弾が埋まっている。

.